

## CENTRO OBSTÉTRICO

- 1) José é técnico de enfermagem, e de acordo com as suas atribuições, só deve administrar medicamentos mediante:
- indicação do tratamento.
  - prescrição médica.
  - avaliação do paciente.
  - anamnese rigorosa.
- 2) Substância gordurosa, esbranquiçada, produzida pelas glândulas sebáceas e que normalmente recobre o corpo do feto. Sua quantidade aumenta à medida que se aproxima o final da gravidez. Alguns estudos mostram uma ação protetora desta substância sobre a pele do feto, trata-se de:
- bossa serossanguínea.
  - vérnixcaseoso.
  - hemangioma capilar.
  - mílio.
- 3) O aleitamento materno tem sido considerado um importante aliado e se revelado como importante estratégia para reduzir a morbimortalidade infantil. Sobre esse tema, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas afirmativas Falsas.
- ( ) O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado.
- ( ) O aleitamento materno exclusivo deve ser oferecido ao bebê até os dois anos de idade.
- ( ) Os principais fatores relacionados à criança, refletindo um ganho de peso inadequado durante o aleitamento materno são: sucção débil; mamadas curtas e ou infrequentes; baixo rendimento do leite ingerido; aumento das necessidades energéticas.
- ( ) O colostro é o nome dado ao leite que inicialmente é produzido pela puerpera e tem uma grande importância para o RN.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- F – V – V – V.
- F – F – V – V.
- V – F – V – V.
- F – F – F – F.

## CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- 4) A avaliação do recém-nascido deve começar no momento do nascimento. Através da Escala de Apgar, são observados alguns sinais, **EXCETO**:
- frequência cardíaca, esforço respiratório e cor.
  - frequência cardíaca, esforço respiratório e tônus muscular.
  - esforço respiratório, irritabilidade reflexa e cor.
  - acuidade visual, coto umbilical e frequência cardíaca.
- 5) Em uma puérpera em pós-operatório de cesareana foi prescrito 500ml de Ringer com lactato e 1.500 ml de SG 5% (solução glicosada a 5%), para ser infundido em 12 horas. Para tanto, o gotejamento deverá ser de:
- 56 gotas por minuto.
  - 58 gotas por minuto.
  - 60 gotas por minuto.
  - 65 gotas por minuto.
- 6) Durante a admissão de uma parturiente de 22 anos, ao aferir os sinais vitais os valores encontrados foram: TAX = 37,8°C; FC = 127 bpm; FR = 25 rpm e PA = 90X60mmhg. Quando realizar suas anotações o técnico em enfermagem deverá utilizar os seguintes termos técnicos para descrever os achados clínicos:
- estado febril, taquicárdica, taquipneica e hipotensa.
  - afebril, taquicárdica, eupneica e hipotensa.
  - afebril, bradicárdica, taquipneica e hipertensa.
  - estado febril, bradicárdica, taquipneica e normotensa
- 7) O conhecimento do técnico em enfermagem sobre as etapas do parto é de extrema relevância para prestar um cuidado seguro e qualitativo à mulher, sendo assim, no pós-parto imediato para detectar e evitar possíveis complicações, é importante o profissional ficar atento a:
- Questionar sobre fome e sede, incentivar a deambulação com apoio, estimular exercícios ativos e passivos no leito, além de medir a diurese horária da puérpera.
  - Inspecionar o tamanho do útero, das mamas, verificar a frequência cardíaca e respiratória de hora em hora, incentivar o banho de aspersão e promover repouso.
  - Encaminhar a paciente ao banho de aspersão, verificar a frequência respiratória e cardíaca de hora em hora e a possibilidade de deambulação precoce.
  - Verificar a presença de sangramento com grande intensidade por via vaginal, inspecionar o globo de segurança de Pinard, estar atento a ocorrência de hipotensão e sudorese intensa.

**CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

- 8) Ao final e em seguida ao segundo parto, a mulher passa a ser denominada, a fim de registro no prontuário, pela seguinte terminologia técnica:
- a) Secundigesta.
  - b) Multípara.
  - c) Secundípara.
  - d) Multigesta
- 9) Para atuação em uma central de processamento de artigos cirúrgicos e hospitalares, o técnico em enfermagem deve reconhecer que os instrumentais cirúrgicos são classificados por grupos. Sendo assim, a tesoura cirúrgica e o porta-agulha pertencem aos seguintes grupos, respectivamente:
- a) redução e superfície.
  - b) síntese e hemostasia.
  - c) diérese e superfície.
  - d) diérese e síntese.
- 10) Uma mulher grávida com 34 semanas de gestação, sem história de epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva, foi atendida no setor de urgência de uma maternidade apresentando convulsões tônico-clônicas generalizadas, quadro hipertensivo e proteinúria. A síndrome hipertensiva que caracteriza esse quadro é a:
- a) síndrome de HELLP.
  - b) pré-eclâmpsia.
  - c) hipertensão crônica.
  - d) eclampsia