

CLÍNICA CIRÚRGICA

1. Um paciente foi internado em clínica médico-cirúrgica para exérese de vesícula biliar por meio de videolaparoscopia. No pós-operatório imediato, ele apresentou dor em região abdominal, com aumento ao respirar. Considerando essa situação hipotética, é provável que a dor seja influenciada por:
 - a) Lesão do músculo masseter.
 - b) Diminuição de ar na cavidade abdominal.
 - c) Lesão do nervo frênico.
 - d) Aerofagia, pois ele ainda está sob efeito de anestesia.
 - e) Diastese abdominal e do gêmeos.

2. Ana tem 22 anos de idade e, devido a um acidente com traumatismo de períneo e abdome, submeteu-se a uma cirurgia para correção do trânsito intestinal, após a qual permaneceu com uma colostomia. É fumante desde os 14 anos de idade e obesa. No pré-operatório imediato, mostrava-se ansiosa e agressiva, chamando a equipe a toda hora, querendo esclarecimentos quanto à cirurgia. Durante a cirurgia, na fase de aproximação das bordas da ferida para a realização da sutura, houve perda de muito sangue, sendo feitas reposições com soluções intravenosas. No pós-operatório, apresentou náuseas e dificuldades respiratórias.

Diante da situação hipotética apresentada, julgue os itens que se seguem.

- I. Colostomia representa uma abertura cirúrgica na parede abdominal para comunicar uma porção do intestino grosso com o exterior.
- II. No período pré-operatório do caso descrito, é melhor dar poucas orientações quanto à cirurgia, pois trata-se de uma mulher jovem, que terá uma alteração no seu corpo, e, assim, quanto mais souber acerca da cirurgia, mais ansiosa poderá ficar.
- III. Ana tem dois importantes fatores de risco: a obesidade e o tabagismo, que aumentam o risco de complicações durante e após a cirurgia.
- IV. O período do pré-operatório imediato é aquele no qual o paciente se submete aos exames que auxiliarão na confirmação do diagnóstico, abrangendo desde a indicação da cirurgia até o dia anterior à mesma.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente os itens I e II estão corretos
- b) Somente os itens III e IV estão corretos
- c) Somente os itens I e III estão corretos
- d) Todos os itens estão corretos
- e) Todos os itens estão incorretos

3. Paciente no pós-operatório de cirurgia abdominal está com os seguintes curativos:

- I- Incisão cirúrgica no abdome sem secreção;
- II- Cateter venoso central;
- III- Bolsa de colostomia;
- IV- Dreno de penrose.

Utilizando-se a técnica asséptica, a sequência correta para a realização dos curativos é:

- a) I,IV,III,II
- b) II, III,IV,I
- c) II,I,IV,III
- d) I,IV,II,III
- e) I,II,III,IV

4. Para realizar o curativo no paciente em pós operatório de Laparotomia, com deiscência de FO infectada por bactéria multirresistente, o Enfermeiro deve adotar como precaução:

- I. Avental e óculos de proteção
- II. Descartar as luvas de procedimento logo após o uso
- III. Realizar o curativo em área privativa
- IV. Usar mascara PFF2 (N95)

Assinale a alternativa correta:

- a) II e IV
 - b) II, III e IV
 - c) I, II e IV
 - d) I, II e III
 - e) III e IV
5. Durante o preparo físico do paciente no período pré-operatório mediato, a equipe de Enfermagem deverá:
- a) Administrar o pré-anestésico para diminuir a ansiedade, ter sono relaxante e diminuir o metabolismo basal.
 - b) Realizar o exame físico, atentando para as condições que podem atuar negativamente: idade, outras doenças e infecções
 - c) Realizar a transferência do cliente da unidade de internação para o centro cirúrgico.
 - d) Realizar o posicionamento do cliente na mesa cirúrgica, monitorizando-o e estruturando a sala cirúrgica.
 - e) Certificar-se de que o material utilizado na cirurgia esteja no centro cirúrgico ao término do procedimento, realizar contagem do material, conferencia de gazes, compressas e outras.

6. N. B., 27 anos, foi submetido à esplenectomia após acidente automobilístico com trauma abdominal fechado e com hemorragia interna. Esse tratamento cirúrgico pode ser classificado, quanto ao Momento Operatório, Finalidade e Potencial de Contaminação, respectivamente, como:
- Urgência – Paliativo – Contaminado.
 - Emergência – Radical – Limpo.
 - Urgência – Paliativo – Potencialmente Contaminado.
 - Urgência – Radical – Limpo.
 - Eletivo – Curativo – Limpo.
7. No pós-operatório de cirurgias ortopédicas, o enfermeiro deve estar atento aos sinais e sintomas da trombose venosa profunda que, se não tratada, pode levar a:
- Hemorragia digestiva
 - Embolia pulmonar
 - Síndrome do desuso
 - Infecção de sítio cirúrgico
 - Hipotensão arterial
8. As úlceras causadas por insuficiência venosa diferem daquelas decorrentes da insuficiência arterial. Com relação às úlceras venosas, é correto afirmar que:
- Localizam-se, com frequência, no terço inferior da perna
 - A pele circundante é seca e não apresenta exsudato
 - Apresentam margens bem definidas
 - É extremamente dolorosas
 - O pulso pedial está ausente
9. Traumatismos superficiais são assim conceituados por lesar a pele e tecido celular subcutâneo, podendo atingir aponeuroses e músculos. O tratamento visa à cicatrização, devendo ser usada a cobertura de acordo com o estágio da ferida. A respeito da ação principal de cada cobertura, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.
- Hidrocoloides.
 - Ácidos graxos essenciais.
 - Alginato de cálcio.
 - Sulfadiazina de prata.
- () Absorção de exsudato.
() Quimiotaxia.
() Ação bactericida imediata e ação bacteriostática residual.
() Desbridamento autolítico.
- 2-1-4-3
 - 3-2-4-1
 - 1-3-2-4
 - 1-2-3-4
 - 3-1-4-2

10. O curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização da ferida, proporcionando um meio adequado para esse processo. A escolha do curativo depende do tipo de ferida. Todos os itens abaixo, estão corretos, **EXCETO**:

- a) O curativo com carvão ativado é indicado para feridas com mau odor, cobertura das feridas infectadas exsudativas com ou sem odor.
- b) A papaína é uma enzima proteolítica proveniente do látex das folhas e frutos mamão verde adulto. Age promovendo a limpeza das secreções, tecidos necróticos, pus e microorganismos.
- c) Os alginatos são indicados para feridas com exsudação de pequena quantidade e abertas.
- d) O curativo com filmes de poliuretano não devem ser utilizados em feridas infectadas.
- e) As coberturas com hidrocolóide são impermeáveis à água e isolam o leito da ferida do meio externo.