

**CENTRO CIRÚRGICO**

1. As cirurgias são classificadas em cirurgias de emergência, de urgência e eletivas. Considerando os conceitos, assinale a alternativa que apresenta cirurgias de urgência:

- a) Hemorragias e perfuração de vísceras por trauma
- b) Ferimento por arma branca ou arma de fogo
- c) Cirurgias de abdome agudo inflamatório e retirada de tumores
- d) Cirurgias de varizes de membros inferiores e de adenoide
- e) Hemorragias e ferimento por arma branca

2. Assinale a alternativa que apresenta o fio cirúrgico ideal para cirurgia:

- a) Ser de alto custo para ser de alta qualidade
- b) Ter presença de reação tecidual
- c) Ser rígido e inflexível
- d) Ser de grande resistência à tração e torção
- e) Ser muito elástico

3. O Índice de Aldrete e Kroulik foi criado e validado em 1970. É utilizado, desde sua criação, na avaliação e evolução dos pacientes no período pós-anestésico pela análise da:

- a) Consciência, das vias aéreas e movimentação
- b) Abertura ocular, da resposta verbal e da resposta motora
- c) Frequência cardíaca, da ansiedade, da pressão arterial e da atividade física
- d) Força muscular, da consciência, da saturação de oxigênio e de gás carbônico
- e) Atividade muscular, da respiração, da circulação, da consciência e da saturação de oxigênio

4. Nas cirurgias torácicas, o tórax deve ser drenado para favorecer a adequada reexpansão pulmonar e permitir o escoamento de sangue, líquido e ar. Considerando os cuidados gerais com dreno pleural, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Manter o frasco de drenagem abaixo do nível do tórax.
- II. Realizar o pinçamento do dreno diariamente, por 45 minutos, para garantir a permeabilidade dos pulmões.
- III. Colocar água esterilizada ou solução fisiológica no frasco coletor, conforme a capacidade do reservatório, de modo a atingir a marca do nível líquido mínimo obrigatório para que seja formado o selo d'água.
- IV. Em caso de aspiração contínua, manter o frasco de aspiração no nível de 1 (um) cm de H<sub>2</sub>O.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
  - b) As afirmativas II e IV estão corretas
  - c) As afirmativas I e III estão corretas
  - d) Apenas a afirmativa I está correta
  - e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
5. Os indicadores biológicos (IB) para controlar ciclos de esterilização são preparações padronizadas de esporos bacterianos comprovadamente resistentes ao método que se propõe monitorar. É correto afirmar que o IB:
- a) Apresenta menor custo em relação ao indicador químico.
  - b) É considerado um método tradicional e pioneiro no controle do sucesso da esterilização, sendo aceito consensualmente como padrão-ouro no controle de resultados de um ciclo de esterilização.
  - c) Não necessita de pacote-teste, podendo ser colocado nos pontos críticos dentro dos próprios pacotes e caixas instrumentais a serem esterilizados.
  - d) Não depende de tempo de incubação, nem de estufas com temperaturas controladas, permitindo leitura rápida.
  - e) Não é um método mais utilizado para controle de esterilização, sendo substituído pelo indicador químico.
6. Sobre a Resolução n. 15, de 15 de março de 2012, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.
- a) Produtos para saúde críticos produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente
  - b) Desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies
  - c) Desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos
  - d) Produtos para saúde não-críticos são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema

**CARGO: ENFERMEIRO**

vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas

e) Produtos para saúde semi-críticos são produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.

7. O protocolo para Cirurgia Segura deverá ser aplicado em todos os locais dos estabelecimentos de saúde em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos, quer diagnósticos, que impliquem em incisão no corpo humano ou em introdução de equipamentos endoscópios, dentro ou fora de centro cirúrgico, por qualquer profissional de saúde. (Ministério da Saúde/Anvisa, 2013). São itens de verificação de segurança cirúrgica que devem ser realizados antes da indução anestésica, exceto:

- a) Confirmar a conexão de um monitor multiparâmetro ao paciente e seu funcionamento.
- b) Revisar verbalmente com o anestesiológico, o risco de perda sanguínea do paciente.
- c) Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua demarcação.
- d) A confirmação da realização da cirurgia correta no paciente correto, no sítio cirúrgico correto.
- e) Verificar se o paciente tem alergia medicamentosa.

8. Considerando-se que a esterilização pelo vapor saturado sob pressão é o método que oferece maior segurança, sendo o mais utilizado nos hospitais brasileiros e, ainda, que o controle de qualidade do processamento é de responsabilidade do enfermeiro de CME, quais são os indicadores de qualidade recomendados no caso do uso de uma autoclave a vapor do tipo pré-vácuo?

- a) Indicador químico classes I, II, V ou VI, indicadores físicos de cada ciclo e indicador biológico.
- b) Indicador químico classes V ou VI e indicador biológico.
- c) Indicadores químicos classes V ou VI e Bowie Dick, indicadores físicos de cada ciclo e indicador biológico.
- d) Indicadores químicos classes I e II, indicadores físicos de cada ciclo e indicador biológico.
- e) Apenas o Bowie-Dick e o indicador biológico em dias alternados.



9. A assistência de Enfermagem perioperatória compreende as atividades desenvolvidas nos períodos abaixo. Não encontra-se corretamente descrito o seguinte período:

- a) Pré-operatório imediato: da véspera da cirurgia até o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico.
- b) Trans-operatório: do momento em que o paciente é recebido no CC até o momento em que é encaminhado para a sala pós-anestésica.
- c) Recuperação pós-anestésica: do momento da alta do paciente da sala de operação até sua alta da sala de recuperação pós-anestésica.
- d) Pós-operatório imediato: da alta do paciente da sala de recuperação pós-anestésica até as primeiras 72 horas pós-operatórias.

10. Em relação aos produtos de assistência respiratória, marque a alternativa correta:

- a) Os produtos de assistência respiratória são classificados como críticos, pois entram em contato direto com as membranas mucosas ou estão conectados a dispositivos que penetram esses tecidos.
- b) Durante a limpeza, não desconectar válvulas, diafragmas e pequenos copos de reservatório, para evitar a perda de tais peças.
- c) Quando submetido a desinfecção química, não é necessário o enxague e a secagem do produto antes do procedimento de desinfecção.
- d) Para os produtos de assistência respiratória, opta-se, preferencialmente, pelo método de esterilização a vapor ou pela desinfecção térmica.